Aufgabe 1. a)

Die Parabel hat die allgemeine Form

$$y = 0,5x^2 + bx + c.$$

Wir setzen die zwei Punkte ein:

$$1 = 0,5 + b + c$$

$$0,5 = b + c$$

$$c = 0,5 - b \quad (I)$$

$$-2,5 = 0,5 \cdot 36 - 6b + c$$

$$-20,5 = -6b + c \quad (II)$$

(I) in (II) :

$$-20,5 = -6b + 0,5 - b$$

$$-21 = -7b \quad b = 3$$

in (I) :

$$c = -2,5$$

Die Gleichung der Parabel p_1 lautet:

$$y = 0,5x^2 + 3x - 2,5$$

Aufgabe 1. c)

Berechnung der Scheitelkoordinaten mit quadratischer Ergänzung:

$$\begin{aligned} y &= -0,25(x^2 + 9x) - 2,5 \\ &= -0,25[(x^2 + 2 \cdot 4,5x + 4,5^2) - 4,5^2] - 2,5 \\ &= -0,25[(x + 4,5)^2 - 20,25] - 2,5 \\ &= -0,25(x + 4,5)^2 + 2,5625 \\ &\Rightarrow S(-4,5|2,5625) \end{aligned}$$

Aufgabe 1. f)

Die Dreiecke werden durch die Vektoren $\vec{AB}$ und $\vec{AC}$ aufgespannt. Diese sind:

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x + 7 \\ 0,5x^2 + 3x - 3,5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AC} = \begin{pmatrix} 7 \\ -3,5 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1. b), e)

Aufgabe 1. d)

Wir berechnen die Schnittpunkte durch Gleichsetzen der beiden Parabelterme:

$$0,5x^2 + 3x - 2,5 = -0,25x^2 - 2,25x - 2,5$$

$$0,75x^2 + 5,25x = 0$$

$$x \cdot (0,75x + 5,25) = 0 \quad x_1 = 0$$

$$0,75x_2 = -5,25$$

$$x_2 = -7$$

Einsetzen in p_1 liefert:

$$y_A = 0,5 \cdot 49 - 21 - 2,5 = 1 \Rightarrow A(-7|1)$$

$$y_B = -2,5 \Rightarrow B(0|-2,5)$$

Damit erhalten wir für den Flächeninhalt des Dreiecks mittels Determinante:

$$A_D = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x+7 & 7 \\ 0,5x^2+3x-3,5 & -3,5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} (-3,5x - 24,5 - 3,5x^2 - 21x + 24,5) = -1,75x^2 - 12,25x [FE]$$

Aufgabe 1. g)

Für die Bestimmung des Extremwertes führen wir die quadratische Ergänzung durch:

$$\begin{aligned} A_{max} &= -1,75(x^2 + 7x) \\ &= -1,75(x^2 + 7x + 3,5^2 - 3,5^2) \\ &= -1,75[(x + 3,5)^2 - 12,25] \\ &= -1,75(x + 3,5)^2 + 21,44 \\ A_{max} &= 21,44 \quad \text{für } x = -3,5 \end{aligned}$$

Aufgabe 2. a)

Das Rechteck hat die Länge $8 - x$ und die Breite $6 + 2x$. Länge mal Breite ist Fläche:

$$A_R = (8 - x)(6 + 2x) = 48 - 6x + 16x - 2x^2 = -2x^2 + 10x + 48$$

Aufgabe 2. b)

$$\begin{aligned} 20 &= -2x^2 + 10x + 48 \\ 0 &= -2x^2 + 10x + 28 \\ x_{1/2} &= \frac{-10 \pm \sqrt{100 + 4 \cdot 2 \cdot 28}}{-4} \\ x_{1/2} &= \frac{-10 \pm 18}{-4} \\ x_1 &= 7 \\ x_2 &= -2 \end{aligned}$$

Für diese beiden Werte beträgt der Flächeninhalt des Rechtecks 20 cm^2 .

Aufgabe 3. a)

Die Scheitelpunktform liegt auf der Hand: die ersten drei Summanden bilden eine binomische Formel:

$$y = (x^2 - 2ax + a^2) + 0,5a - 2 = (x - a)^2 + 0,5a - 2 \Rightarrow S_a(a | 0,5a - 2)$$

Wer dies nicht auf Anhieb sieht, kann auch die quadratische Ergänzung durchführen.

Aufgabe 3. b)

$$\begin{aligned} S_{-2}(-2 | -3) \\ S_0(0 | -2) \\ S_{-3}(-3 | -3,5) \end{aligned}$$

Aufgabe 3. c)

Die Parameterdarstellung des Trägergraphs der Scheitelpunkte ist:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0,5a - 2 \end{pmatrix}$$

Und mit $x = a$:

$$y = 0,5x - 2$$

Aufgabe 3. d)

Wir setzen den Punkt ein:

$$62 = 64 - 8 \cdot 2a + a^2 + 0,5a - 2$$

$$0 = a^2 - 15,5a$$

$$0 = a(a - 15,5) \quad a_1 = 0$$

$$0 = a - 15,5 \quad a_2 = 15,5$$

Aufgabe 3. e)

Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat die Form:

$$y = x^2 + bx + c$$

Wir bilden zwei Gleichungen, indem wir die zwei gegebenen Punkte einsetzen:

$$-0,75 = (-1,5)^2 - 1,5b + c$$

$$-3 = -1,5b + c \quad (I)$$

$$8 = 1 + b + c$$

$$7 - b = c \quad (II)$$

II in I

$$-3 = -1,5b + 7 - b$$

$$-10 = -2,5b$$

$$b = 4 \quad c = 3$$

Die Gleichung dieser Parabel lautet also:

$$y = x^2 + 4x + 3$$

Wenn die Parabel zur Schar gehören soll, muss $4x = 2ax$, also $a = 2$ gelten. Damit wäre der Funktionsterm:

$$p_2 : y = x^2 - 2 \cdot 2x + 2^2 + 0,5 \cdot 2 - 2 = x^2 - 4x + 3$$

⇒ Die Parabel gehört zur Schar.

Aufgabe 4. a)

Zur Scheitelbestimmung ergänzen wir quadratisch:

$$y = -1,5(x^2 - 4x) - 4,5$$

$$= -1,5[(x^2 - 4x + 2^2) - 2^2] - 4,5$$

$$= -1,5[(x - 2)^2 - 4] - 4,5$$

$$= -1,5(x - 2)^2 + 6 - 4,5$$

$$= -1,5(x - 2)^2 + 1,5$$

Der Scheitel ist bei $S(2|1,5)$; die Wertemenge ist $\mathbb{W} =] - \infty; 1,5]$

Aufgabe 4. b)

Wir vergleichen den y-Wert des Punktes mit dem Funktionswert der Parabel an dieser Stelle:

$$-25 \stackrel{<}{>} -1,5 \cdot (-11)^2 + 6 \cdot (-11) - 4,5$$

$$-25 \stackrel{<}{>} -181,5 - 66 - 4,5$$

$$-25 > -252$$

⇒ Der Funktionswert ist kleiner, somit ist der Punkt oberhalb der Parabel.

Aufgabe 5. a)

Bei einer Spiegelung an der x-Achse multiplizieren wir das y , also den gesamten Funktionsterm mit -1 und erhalten:

$$f'(x) = -4(x + 1,5)^2 + 3$$

Bei einer anschließenden Spiegelung an der y-Achse multiplizieren wir das x , das im Funktionsterm enthalten ist, mit -1 und erhalten:

$$f''(x) = -4(-x + 1,5)^2 + 3 \quad \text{oder} \quad f''(x) = -4(x - 1,5)^2 + 3$$

Aufgabe 6. a)

Mit dem gegebenen Scheitel ist die Parabel der Form:

$$g(x) = a(x - 80)^2 + 31,25$$

Hier setzen wir den weiteren gegebenen Punkt ein und erhalten a:

$$20 = a(50 - 80)^2 + 31,25$$

$$-11,25 = 900a$$

$$a = -\frac{1}{80}$$

$$\Rightarrow g(x) = -\frac{1}{80}(x - 80)^2 + 31,25$$

Aufgabe 6. b)

Am Boden ist $y = 0$; Wir berechnen die Nullstellen der Wurfparabel:

$$-\frac{1}{80}(x - 80)^2 + 31,25 = 0$$

$$-\frac{1}{80}(x - 80)^2 = -31,25$$

$$(x - 80)^2 = 2500$$

$$x - 80 = \pm 50$$

$$x_1 = 130$$

$$(x_2 = 30)$$

Die erste Lösung ist der gesuchte x-Wert. Der Pfeil ist $130 \text{ m} - 50 \text{ m} = 80 \text{ m}$ weit geflogen.

Aufgabe 7.

Besitzt eine Parabel Nullstellen, so ist die x-Koordinate ihres Scheitels genau der Mittelwert der x-Werte der Nullstellen; hier ist x_S :

$$x_S = \frac{-4,5 + 3,5}{2} = -0,5$$

Hier geht es zurück zum [Aufgabenblatt](#)