Aufgabe 1.

$$\frac{1}{2} \cdot (8x + y)^2 = 32x^2 + 8xy + \frac{1}{2}y^2$$

Aufgabe 2. a)

Wir formen um:

$$-4x^2 + 2x + 2 \geq 0$$

Zum Faktorisieren setzen wir in die Mitternachtsformel ein:

$$x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot (-4) \cdot 2}}{2 \cdot (-4)} = \frac{-2 \pm 6}{-8}$$

$$x_1 = -\frac{1}{2} \quad x_2 = 1$$

Mit den erhaltenen Lösungen und dem Vorfaktor $a = -4$ formen wir um zu:

$$-4 \left(x + \frac{1}{2} \right) (x - 1) \geq 0 \quad (*)$$

Für dieses Produkt erstellen wir eine Vorzeichen-tabelle:

	$x < -\frac{1}{2}$	$x = -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
-4	-	-	-	-	-
$(x + \frac{1}{2})$	-	0	+	+	+
$(x - 1)$	-	-	-	0	+
$(*)$	-	0	+	0	-

Es folgt für die Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \{x \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq 1\}$

Aufgabe 2. b)

Wir gehen analog zu a) vor:

$$-\frac{1}{2}x^2 + 2x - 2 > 0$$

Die Mitternachtsformel liefert:

$$x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot (-2)}}{2 \cdot (-\frac{1}{2})} = \frac{-2 \pm 0}{-2} = 1$$

Es gibt nur eine Lösung. Wir faktorisieren...

$$-\frac{1}{2} \cdot (x - 1)^2 > 0 \quad (**)$$

...und erstellen eine Vorzeichen-tabelle:

	$x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$-\frac{1}{2}$	-	-	-
$(x - 1)^2$	+	0	+
$(*)$	-	0	-

Die Lösungsmenge ist, weil es keine Werte größer als null gibt, leer: $\mathbb{L} = \{\}$

Aufgabe 3.

Dies ist nur eine quadratische Gleichung, wenn $a \neq 0$

Damit erhalten wir für Fall 1: $a = 0 \Rightarrow$ lineare Gleichung $\Rightarrow$ Eine Lösung

Fall 2: $a \neq 0$ Zur Bestimmung der Anzahl der Lösungen bestimmen wir die Diskriminante $b^2 - 4ac$:

$$D = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 4 \cdot a \cdot 1 = \frac{9}{4} - 4a$$

Wir setzen nun $D = 0$ und erhalten für a :

$$\frac{9}{4} - 4a = 0 \quad | + 4a$$

$$\frac{9}{4} = 4a \quad | : 4$$

$$\frac{9}{16} = a$$

Zur weiteren Fallunterscheidung erstellen wir eine Vorzeichentabelle:

	$a < \frac{9}{16}$	$a = \frac{9}{16}$	$a > \frac{9}{16}$
$\frac{9}{4} - 4a$	+	0	-
D	+	0	-
Anzahl Lösungen	2	1	0

Für $a \in]-\infty; 0[\cup]0; \frac{9}{16}[$ gibt es zwei Lösungen; Für $a = \frac{9}{16}$ oder $a = 0$ gibt es eine Lösung und für $a > \frac{9}{16}$ gibt es keine Lösung.

Aufgabe 4.

Wir setzen Parabel- und Geradenterm gleich und vereinfachen:

$$\begin{aligned} mx + \frac{3}{2} &= x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2} & | - \frac{3}{2} \\ mx &= x^2 - \frac{3}{2}x & | - mx \\ 0 &= x^2 - \left(\frac{3}{2} + m\right)x & \\ 0 &= x \cdot \left(x - \frac{3}{2} - m\right) & \end{aligned}$$

Ein Produkt ist gleich 0, wenn einer der Faktoren null wird; daraus folgt:

$$x_1 = 0$$

$$x_2 - \frac{3}{2} - m = 0$$

$$x_2 = \frac{3}{2} + m$$

Wir haben nun zwei Lösungen für den Schnitt der Geraden mit der Parabel. Die Gerade soll jedoch *Tangente* sein, und diese Tangente hat nur *einen* Berührungspunkt. Dies bedeutet, dass wir m so wählen, dass beide Lösungen für x_1 und x_2 identisch sind, also

$$x_2 = 0 \Rightarrow m = -\frac{3}{2}$$

Skizze für $m = 1$

Aufgabe 5. a)

Zum Berechnen der Schnittpunkte setzen wir beide Terme gleich. Zuerst müssen wir die y-Seiten gleich machen. Hier bietet sich an, den ersten Term mit (-4) zu multiplizieren.

$$\begin{aligned}
 I : \quad & -4y = -\frac{9}{4}x + 5 \\
 II : \quad & -4y = -ax - 5 \\
 I = II \quad & -\frac{9}{4}x + 5 = -ax - 5 \quad | -5 + ax \\
 & -\frac{9}{4}x + ax = -10 \\
 & \left(-\frac{9}{4} + a\right) \cdot x = -10 \quad | \cdot (-4) \\
 & (9 - 4a) \cdot x = 40 \quad | : (9 - 4a) \\
 & x = \frac{40}{9 - 4a}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 5. b)

Wenn der Nenner des Terms null wird, gibt es keine Lösung und damit keinen Schnittpunkt:

$$9 - 4a = 0 \Rightarrow a = \frac{9}{4}$$

In diesem Fall sind die beiden Geraden parallel.

Aufgabe 5. c)

$$\begin{aligned}
 -8 &= \frac{40}{9 - 4a} \quad | \cdot (9 - 4a) \\
 -72 + 32a &= 40 \quad | + 72 \\
 32a &= 112 \quad | : 32 \\
 a &= 3,5
 \end{aligned}$$

Das war gar nicht schwierig!

Hier geht es zurück zum [Aufgabenblatt](#)