Aufgabe 1. a)

Es sei M die Masse des Phobos, m die Masse des zu beschleunigenden Probekörpers, G die Gravitationskonstante und R der Radius von Phobos. Nach dem Gravitationsgesetz gilt:

$$\begin{aligned} m \cdot g_{Ph} &= \frac{G \cdot M \cdot m}{R^2} && | : m \\ g_{Ph} &= \frac{G \cdot M}{R^2} \\ g_{Ph} &= \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \cdot 1,1 \cdot 10^{16} \text{ kg}}{(11\,000 \text{ m})^2} \\ g_{Ph} &= 6,1 \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{aligned}$$

Aufgabe 1. b)

Der Ball soll Phobos auf einer oberflächennahen Kreisbahn umrunden. Hierbei gilt das Kräftegleichgewicht zwischen Zentripetalkraft und Gravitationskraft:

$$\begin{aligned} \frac{m \cdot v^2}{R} &= \frac{G \cdot M \cdot m}{R^2} && | : m \cdot R \\ v^2 &= \frac{G \cdot M}{R} && \sqrt{\quad} \\ v &= \sqrt{\frac{G \cdot M}{R}} \\ v &= \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \cdot 1,1 \cdot 10^{16} \text{ kg}}{11\,000 \text{ m}}} \\ v &= 8,2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Der Ball soll mit einer Geschwindigkeit von $v = 8,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ abgeworfen werden. (Also nicht zu fest werfen, sonst verschwindet er im Weltall!)

Aufgabe 1. c)

Der Umfang der Kreisbahn sei $U = 2\pi \cdot R$. Dann ist die benötigte Zeit gleich (zur Erinnerung: $s = v \cdot t$):

$$t = \frac{U}{v} = \frac{2\pi \cdot R}{v} = \frac{2\pi \cdot 11\,000 \text{ m}}{8,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 8430 \text{ s} \approx 2 \text{ h}20 \text{ min}$$

Die Umlaufdauer ist mit über zwei Stunden sehr lang; man sollte sich also etwas zum Lesen mitnehmen...

Aufgabe 2. a)

- Größerer Abstand zum Erdmittelpunkt bedeutet geringere Anziehung.
- Am Pol wirkt keine Zentrifugalkraft, diese ist am Äquator maximal.

Aufgabe 2. b)

Die Formel zur Berechnung von g lässt sich mit dem Gravitationsgesetz herleiten:

$$\begin{aligned} mg &= \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} && | : m \\ g &= \frac{G \cdot M}{r^2} \\ g_{Pol} &= \frac{6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \cdot 5,972 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{(6357 \cdot 10^3 \text{ m})^2} = 9,860 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ g_{Aeq}^* &= \frac{6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \cdot 5,972 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{(6378 \cdot 10^3 \text{ m})^2} = 9,798 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{aligned}$$

g_{Aeq}^* ist noch ohne Berücksichtigung der Zentrifugalbeschleunigung a_z ; diese muss noch abgezogen werden, um g_{Aeq} zu erhalten:

$$\begin{aligned} a_z &= \omega^2 r \\ &= \left(\frac{2\pi}{24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}}\right)^2 \cdot 6378 \cdot 10^3 \text{ m} \\ &= 5,368 \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ g_{Aeq} &= g_{Aeq}^* - a_z = 9,793 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{aligned}$$

Hierbei ist zu beachten, dass der Effekt der Fliehkraft viel kleiner ausfällt als der der Radiendifferenz. Der relative Unterschied der Erdbeschleunigungen ist:

$$\frac{g_{Pol} - g_{Aeq}}{g_{Pol}} = 0,68\%$$

Aufgabe 3.

Wir setzen Zentrifugal- gleich Gravitationskraft:

$$\begin{aligned} \frac{mv^2}{r} &= \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} && | : mv^2 \cdot r^2 \\ r &= \frac{G \cdot M}{v^2} \\ r &= \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \cdot 10 \cdot 1,98 \cdot 10^{30} \text{ kg}}{(3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2} \\ r &= 15 \cdot 10^3 \text{ m} \end{aligned}$$

Aufgabe 4.

Die Masse der Erde sei M_E , die des Mondes M_M . Der Abstand dieses Punktes zur Erde sei $d - r$. Dann gilt für die Gravitationskräfte:

$$\begin{aligned} F_{G,Erde} &= F_{G,Mond} \\ \frac{G \cdot M_E \cdot m}{(d-r)^2} &= \frac{G \cdot M_M \cdot m}{r^2} \\ \frac{M_E}{(d-r)^2} &= \frac{M_M}{r^2} \\ \frac{M_E}{M_M} &= \frac{(d-r)^2}{r^2} \\ \sqrt{\frac{M_E}{M_M}} &= \frac{d-r}{r} \\ \sqrt{\frac{M_E}{M_M}} &= \frac{d}{r} - 1 \\ r &= \frac{d}{\sqrt{\frac{M_E}{M_M}} + 1} = \frac{384\,400 \text{ km}}{\sqrt{\frac{5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}} + 1}} = 38\,400 \text{ km} \end{aligned}$$

Aufgabe 5. a)

Der Radius seiner Umlaufbahn ist:

$$r = \frac{v \cdot T}{2\pi} = \frac{3700 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 130 \cdot 60 \text{ s}}{2\pi} = 4,6 \cdot 10^6 \text{ m}$$

Daraus folgt für den Planetenradius:

$$R = r - 800 \text{ km} = 3,8 \cdot 10^6 \text{ m} \approx 3800 \text{ km}$$

Aufgabe 5. b)

Wir setzen Gravitation gleich Zentripetalkraft und lösen nach M auf:

$$\begin{aligned} \frac{mv^2}{r} &= G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} \\ M &= \frac{v^2 \cdot r}{G} = \frac{(3700 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2 \cdot 3,8 \cdot 10^6 \text{ m}}{6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}} = 9,4 \cdot 10^{23} \text{ kg} \end{aligned}$$

Damit hat er knapp ein Sechstel der Erdmasse.

Aufgabe 5. c)

Wir setzen Gewichtskraft gleich Gravitation:

$$mg = G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}$$

$$g = G \cdot \frac{M}{r^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \cdot \frac{9,4 \cdot 10^{23} \text{ kg}}{(3,8 \cdot 10^6 \text{ m})^2} = 4,34 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Hier geht es zurück zum [Aufgabenblatt](#)